

Neuroblastom

Nervvävnadstumörer, eller neuroblastom, är en typisk småbarnscancer och förekommer nästan inte alls hos vuxna. Vanligast är den vid två till fyra års ålder. Cancern utgår från det sympatiska nervsystemet, som sträcker sig på bägge sidor längs ryggraden. De flesta neuroblastom utgår från nerver eller binjurar och sitter längs ryggraden.

Det är en cancerform med stora variationer i både uppkomst och förlopp, där det kan finnas milda former som även ibland kan gå tillbaka spontant, men också väldigt aggressiva former som kan vara dödliga trots intensiv behandling.

Symptom

Symptomen vid neuroblastom kan variera mycket, från inga alls till ett svårt sjukt barn, beroende på var tumören sitter.

Behandling

Behandlingen varierar lika mycket som symptomen. Ibland, om det är en liten tumör, kan det räcka med att operera bort den, medan det blir väldigt komplicerat om tumören har större spridning och kanske till och med dottertumörer.

För det mesta krävs cytostatikabehandling och en operation för att få bort tumören. Men ungefär hälften av alla svårt insjuknade barn får återfall trots att de verkade botad till en början.

Mer information hittar du under:

www.barncancerfonden.se/content2/index.php?realm=30 och

www.growingpeople.se/templates/Page.aspx?id=5264